

原 著

- Similarity of Amino Acid Composition Based on Gene Assembly
and Different Gene-size Distributions among the 11 Chromosomes
in *Encephalitozoon cuniculi*Teiji Okayasu et al ... (1)
- Studies on Relationship between nbl (S3a) mRNA Levels,
Cell Density, and Chemosensitivity in Various Rat and
Human Cell LinesKazuhiro Nemoto ... (7)
- Airway Expression of Smad7, a TGF- β -inducible
Inhibitory Molecule of TGF- β Signaling, Decreases after Repeated
Airway Antigen ChallengesMayumi Ota et al ... (17)
- Leukotriene C₄ in Combination with Transforming
Growth Factor- β Augments Extracellular Matrix Production from
Human Lung FibroblastsTakuma Asakura et al ... (27)
- マイクロウェーブ照射による硬組織内の軟部組織固定法
—モルモット内耳形態の電子顕微鏡観察—龍見 京良 ... (37)
- ヘパリンカラムによる血清由来の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼの分析
—骨吸収マーカー破骨細胞由来酒石酸抵抗性酸ホスファターゼを
モニターする新しい方法—清水 左門 他 ... (45)
- アレルギー性鼻炎における血清ECPと血漿ECPの違いについて三須 俊宏 ... (57)
- アフガニスタン難民の低栄養児の月別変動の検討
—年齢, 性別, 重症度を中心に—加賀谷 厚 ... (65)
- 本学における診療参加型臨床実習に関する考察
—モデル・コア・カリキュラムの導入と診療参加型臨床実習のあり方—今高 城治 他 ... (73)
- 食道粘膜細胞修復におけるHGF (Hepatocyte Growth Factor) の
役割とNSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) の作用高田 博信 他 ... (79)
- 酸化ストレスにより誘導される内分泌機能変化に対する松寿仙の影響叶 社房 他 ... (91)

