

CONTENTS

第32巻 第1号 2005

原 著

- Differences in Duration and Magnitude of Vasodilative
Effect by Sympathetic Block with Ropivacaine 0.2% and
Mepivacaine 0.5% in DogsYoshiyuki Takahashi et al ... (1)
- Immunohistochemical Study of Cytokeratin Related Protein
Expression in Patients with Trichilemmal Tumors and
Squamous Cell Carcinoma of the SkinNaoto Hama ... (7)
- 急性心筋梗塞に対する冠血管形成術におけるモンテプラゼ先行投与の長期成績 ...千田 龍二 ... (13)
- 栄養指標蛋白としてのトランスフェリン, トランスサイレチンおよび
レチノール結合蛋白の測定意義中島あつ子 他 ... (21)
- 胃粘膜上皮細胞における trefoil factor family 1 (TFF1)
発現に影響を与える因子に関する検討藤井陽一朗 他 ... (29)
- 副腎皮質ステロイド注射はラット腱細胞のアポトーシスを誘導する岩波佳江子 ... (39)
- Ulinastatinの腫瘍における血管新生に対する抑制効果吉井 直子 ... (47)

症例報告

- Thrombophlebitis in Central Vein Caused by Indwelling Catheter for
Total Parenteral Nutrition : A Case Report and Venous Angiographic
Study of 27 Cases with Central Vein CatheterizationMasahiko Yamaguchi et al ... (57)
- ブチル-2-シアノアクリレートを用いた内視鏡的硬化療法が
有効であった出血性十二指腸静脈瘤の2例藤井陽一朗 他 ... (63)

総 説

- 輸血拒否患者に対する医師の対応について
—判断能力のある成人患者に対して—一杉 正仁 他 ... (71)

